

## NECROSIS ISQUEMICA DEL PEZON

Uno de los primeros signos de la enfermedad es una lesión bien delimitada de rojo a negro en la piel de la base del pezón. Como resultado, la vaca puede verse constantemente lamiendo sus pezones. Este comportamiento puede causar que las tetas se traumatizan rápidamente o incluso que la vaca las elimine por completo.



**Necrosis isquémica bovina del pezón (ITN).** La lesión es una lesión roja bien delimitada en la cara medial de la tetina. Fotografía cortesía de Roger Blowey, Appithorne, Minsterworth, Gloucester.



**Necrosis Isquémica del Pezón.** La tetina cercana se ve gravemente comprometida después de que la vaca se haya autotraumatizado. El pezón lejano tiene una lesión ITN relativamente temprana en la base del pezón.

En términos de diagnóstico, hay varias otras enfermedades de la piel que pueden afectar la piel del pezón y la ubre bovina; Sin embargo, el principal signo clínico diferenciador de esta enfermedad es el auto-trauma distintivo. Otras enfermedades, como la mamilitis por herpes bovino, pueden hacer que la vaca se oponga al ordeño, pero en tales casos, por lo general, no se lame las tetas ni se daña físicamente.



La Mamilitis por virus herpes bovino (BHM). La lesión es más exudativa y ulcerosa que la Necrosis Isquémica del Pezón, y tiene una afectación más general de la piel de la ubre.

**Fuente: Universidad de Liverpool, Inglaterra**